




1



2



3

Fesselträgerkörper-Desmitis

- Läsion im mittleren Teil
- Schwellung, Druckschmerz und Überwärmung mittig am Röhrebein
- Kann auch mit Schäden am Ursprung oder Schenkeln auftreten

4

Fesselträgerschenkel-Desmitis

- Läsion im distalen Drittel
- Schmerzhafte Schädigung und Entzündung der Fesselträgerschenkel
- Lahmheit
- Schwellung und Überwärmung distal am Röhrebein / unterhalb des Fesselgelenks

5

Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSL/D)

- chronisch-degenerative Bindegewebs-erkrankung
- Fortschreitende Auflösung des Fesselträgers -> oft betrifft es auch andere Bindegewebe
- Vermutlich gibt es eine genetische Komponente/Prädisposition

6



Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSLSD)


Symptome:

- Oftmals fällt die Durchtrittigkeit zuerst auf
- Die Fesselköpfe senken sich immer mehr ab
- Meistens sind die Hintergliedmassen als erstes betroffen
- Die Fesselträger können geschwollen und auffallend dick sein

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

7



Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSLSD)


Symptome:

- DSLSD zeigt sich am häufigsten am Fesselträger, am den Beugesehnen, am Nackenband und am Knie
- Es können aber auch Organe und Blutgefäße betroffen sein

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

8



Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSLSD)

Symptome:

- Häufiges stolpern, steifer Gang, kurzer »trippeliger« Gang
- Galopp wird teilweise vermieden oder nur noch unwillig gezeigt
- Die Beine werden teilweise weit nach hinten raus gestellt
- Die Pferde versuchen die Beine in der Einstreu in gebuddelten Löchern zu entlasten

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

9



Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSLSD)

Symptome:

- Nach dem Liegen stehen die Pferde teilweise nicht direkt auf, sondern sitzen noch eine Weile
- Bei akuten Schüben wirken die Pferde teilnahmslos und apathisch -> Schmerzerkennung
- Die Haut lässt sich bei gewissen Pferden extrem weit vom Körper wegziehen

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

10




Degenerative Fesselträger-Desmitis (DSLSD)

- Die Krankheit wird meistens im Alter zwischen 7 und 15 Jahren bemerkt
- Pferde mit PPID sind häufiger betroffen
- Der Verlauf ist langsam und schleichend, in gewissen Phasen zeigen die Pferde teilweise keine Lahmheit

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

11



Fesselringbandsyndrom

- Primäres und sekundäres Fesselringbandsyndrom
- Lahmheit und Schmerzen/Abwehrreaktion bei Druck auf das Fesselringband
- Einziehung oberhalb des Sporns, evt. zusätzlich eine vermehrte Füllung in der Fesselbeugehohlscheide

© www.vetwissen-gherd.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.vetwissen-gherd.com

12



WISSEN-PFERD.COM

Mediathek – rund um die Themen
Stoffwechsel, Biomechanik, Faszien(-linien)
& Interieur des Pferdes

www.facebook.com/wissenpferd
www.instagram.com/wissenpferd