



Die Beurteilung des Reitpferdes mittels der Checkliste Schmerzethogramm

Sonja Bucher & Mariana Blösch
Februar 2026




1



Wie erkenne ich ein Schmerzgesicht bei meinem Pferd?

- Das Schmerzgesicht des Pferdes mit Erfassungsbogen
- <https://www.wissen-pferd.com/dankesseite-schmerzgesicht>

2



Probleme im Bewegungsapparat sind schwierig zu erkennen

- Gering- bis mittelgradige Lahmheiten sind schwierig zu erkennen.
- 47% der Pferde, die als nicht lahm eingeschätzt wurden, waren lahm.
- 52 % hatten Probleme in der Vorhand
- 63.4 % waren hinterhandlahm

(Dyson et al. 2017 mit 506 Pferden)

3



Ethogramm des gerittenen Pferdes von Sue Dyson

Checkliste mit 24 Verhaltensweisen, um muskuloskeletale Schmerzen beim Pferd zu erkennen bzw. um weitere Abklärungen einzuleiten.

Sue Dyson konnte in mehreren Studien belegen, dass die Verhaltensweisen der Checkliste weniger wurden, nachdem die Pferde eine Leitungsanästhesie erhalten haben.

Quelle: www.sue-dyson.com

© www.wissen-pferd.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

4



Ethogramm des gerittenen Pferdes von Sue Dyson

- Zeigt das Pferd **8 oder mehr** der folgenden Verhaltensweisen, hat das Pferd ziemlich sicher Schmerzen im Bewegungsapparat und sollte in einer spezialisierten Pferdeklinik abgeklärt werden.
- Normal sind bei gesunden Pferden 2 der folgenden Verhaltensweisen.
- Bei mehr als 2 Verhaltensweisen, aber weniger als 8 sollte man das Pferd sehr gut beobachten.

Quelle: www.sue-dyson.com

© www.wissen-pferd.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

5



Ethogramm des gerittenen Pferdes von Sue Dyson

- Pferd aus mehreren Perspektiven filmen
 - von vorne
 - von hinten
 - Linke und rechte Hand
- Aufwärmphase und 10 Minuten der Trainingseinheit filmen
- Wenn möglich wird das Pferd in allen Gangarten und eine 8 (Volte links / rechts) geritten

Quelle: www.sue-dyson.com

© www.wissen-pferd.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

6



Quelle: <https://sue-dyson.com>

Ethogramm des gerittenen Pferdes von Sue Dyson

Folgende Bereiche werden analysiert

- Kopf
- Körper
- Bewegung / Takt

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

7

7



Quelle: <https://sue-dyson.com>

1. Ohrenstellung

Die Ohren sind für mindestens 5 Sekunden oder länger angelegt.

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

8

8



Quelle: <https://sue-dyson.com>

2. Geschlossene Augen

Die Augenlider sind für 2-5 Sekunden halb oder ganz geschlossen.

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

9

9



3. Das Weiss im Auge ist sichtbar

Wiederholte Sichtbarkeit der Sklera (Weiss im Auge).

Manche Pferde haben eine weiss umrandete Iris («Menschenauge») oder blauen Augen, dann ist dieses Kriterium nicht anwendbar.

Wichtig: Immer die rechte und linke Seite des Pferdes vergleichen, die Augen könnten teilweise unterschiedlich sein.

Quelle: <https://stockbyte.com>

© www.vetexam-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

10



4. Intensives Starren

Das Pferd zeigt intensives Starren oder einen abwesenden Blick für mindestens 5 Sekunden.

Quelle: <https://stockbyte.com>

© www.vetexam-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

11



5. Maul geöffnet/geschlossen

Wiederholtes Maul öffnen und schliessen für 10 Sekunden oder länger, oder ein permanent geöffnetes Maul für länger als 10 Sekunden.

Quelle: <https://stockbyte.com>

© www.vetexam-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

12



6. Zunge sichtbar

Die Zunge hängt einseitig aus dem Maul oder wird immer wieder herein- und herausgeschoben.

D.h. die ganze Zunge ist sichtbar, sie kann aber auch nur teilweise sichtbar sein oder Teile der Zunge.

Quelle: <https://panday.com>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

13



7. Gebiss durch das Maul gezogen

Das Gebiss wird zu einer Seite aus dem Maul herausgezogen.

Quelle: <https://panday.com>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

14



8. Verwerfen im Genick


Wiederholtes verwerfen im Genick/kopf oder der Kopf wird schief gehalten.

Quelle: <https://panday.com>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WISSEN-gherl.com

15



9. Wiederholte Änderung der Kopf-Halsposition

Kopfschlagen hoch und runter oder Kopfbewegungen nicht im Rhythmus der Bewegung.

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.veterinär-gesund.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

16



10. Kopf vor/über der Senkrechten

Der Kopf ist für mindestens 10 Sekunden oder länger mehr als 30 Grad vor der Senkrechten. («Gegen die Hand»).

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.veterinär-gesund.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

17



11. Kopf hinter der Senkrechten

Kopf wird für 10 Sekunden oder länger hinter der Senkrechten getragen.

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.veterinär-gesund.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

18



12. Seitliche Kopfbewegungen

Kopf-Halsposition ändert sich: Wiederholtes Kopfschütteln zur Seite (hin und her).

Quelle: Hippi (Instagram.com)

© www.vetwissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WITTI 2024

19



13. Schweifhaltung

Der Schweif wird schief getragen oder ist eingeklemmt.

Der Schweif schwingt nicht rhythmisch mit der Bewegung mit oder wird dauerhaft zu einer Seite gehalten.

Quelle: Hippi (Instagram.com)

© www.vetwissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WITTI 2024

20



14. Schweifschlagen

Wiederholtes Schweifschlagen (auf und ab, oder nach links und rechts oder in kreisförmiger Bewegung).

Quelle: Hippi (Instagram.com)

© www.vetwissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

WITTI 2024

21



15. Hastiger oder unregelmässiger Rhythmus im Trab

Eine Frequenz von 40 oder mehr Tritten im Trab innerhalb von 15 Sekunden.

Quelle: <https://stockphoto.com>

© www.vhs-germany.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

22



16. Verlangsamter Trab

Trab (Arbeitstrab) zu langsam, weniger als 35 Tritte innerhalb von 15 Sekunden.

Quelle: <https://stockphoto.com>

© www.vhs-germany.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

23



17. Bewegung auf drei Hufspuren

Das Pferd bewegt sich auf drei Hufschlägen. Die Hinterbeine folgen nicht den Spuren der Vordergliedmassen.

Quelle: <https://stockphoto.com>

© www.vhs-germany.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

24



18. Störungen im Galopp

Wiederholtes Angaloppieren im falschen Galopp (zweimal oder häufiger), wiederholtes Umspringen, oder Kreuzgalopp.

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.wissen-gherl.com

25

25



19. Spontaner Tempowechsel

Plötzlicher Wechsel von einer Gangart in die andere, wie z.B. das Ausfallen vom Galopp in den Trab oder Galopp anstatt Trab.

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.wissen-gherl.com

26

26



20. Zehenschleifen oder Stolpern

Wiederholtes Stolpern (mehr als einmal) oder wiederholtes Zehenschleifen.

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=...>

© www.wissen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.wissen-gherl.com

27

27



Quelle: <https://stock.com>

21. Unerwartete Richtungswechsel

Plötzliche ungefragte Richtungswechsel und/oder plötzliches Erschrecken / Scheuen.

© www.steigen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.steigen-gherl.com

28



Quelle: <https://stock.com>

22. Weigerung Vorwärtsgehen / Spontanes Stoppen

Pferd geht nicht freiwillig vorwärts (Klemmen, «Triebbig»)

© www.steigen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.steigen-gherl.com

29



Quelle: <https://stock.com>


23. Steigen

Das Pferd steigt.

© www.steigen-gherl.com by Sergio Bucher & Martina Bloch

www.steigen-gherl.com

30



Quelle: <https://sandiego.com>

23. Ausschlagen oder buckeln

Buckeln oder ausschlagen mit einem oder beiden Hinterbeinen.

31

[illegible]

Ethogramm des gerittenen Pferdes von Sue Dyson



A photograph showing a rider on a dark horse, viewed from the side, in a wooded area. The rider is wearing a grey jacket and light-colored breeches. The horse is dark-colored and has a white saddle pad. The background consists of bare trees and a fence.

- Zeigt das Pferd **8 oder mehr** der Verhaltensweisen, hat das Pferd **ziemlich** sicher Schmerzen im Bewegungsapparat und sollte in einer spezialisierten Pferdeklind. abgeklärt werden.
- Normal sind bei gesunden Pferden 2 der 24 Verhaltensweisen.
- Bei mehr als 2 Verhaltensweisen, aber weniger als 8 sollte man das Pferd sehr gut beobachten.

Quelle: www.ethogramm.com

© www.wissen-sport.com by: Sandra Bucher & Martina Blösch

WITTIUMS
WITTIUMS

32



WISSEN-PFERD.COM

WISSEN-PFERD.COM

Mediathek - rund um die Themen
Stoffwechsel, Biomechanik, Faszien(-linien)
& Interieur des Pferdes

www.facebook.com/wissenpferd
www.instagram.com/wissenpferd



33
